

Voyage M. Émile Gounelle au Brésil

EUMOLPIDES

Par M. ÉDOUARD LEFÈVRE.

Séance du 22 août 1888.

Chrysodinites.

SPINOTHEROPHYTA LAMPROS. — *Sublongo-ovata, convexa, corpore subtus cum pedibus cærulea, viridi-reflexo-tincta, supru viridi-aurata, fulgida, elytris aurato-cupreis, antennis cyaneis, articulis 3 basalibus ferrugineis, tarsis piceo-nigris.* — Long. 3—3 1/4 mill.; lat. 1 1/2—1 3/4 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput subtiliter plicato-alutaceum, crebre punctulatum, vertice fo-veola parva instructo, labro piceo-nigro. Prothorax subremote aciculatum punctatus, interstitiis minutissime (oculo armato) punctulatis. Scutellum lœve. Elytra sublineatim parum dense punctata. juxta suturam versus apicem punctato-striata.

CHRYSODINA AURICHALCEA Germ.. *Ins. sp. nov.*, p. 574.

Chr. fulgorans Harold, *Col. Heft.*, XII, 1874, p. 56. — *Spintherophytia ignita* Dej., *Cat.*, éd. 3, p. 434.

Caraça (Minas-Geraes).

CHR. PURPUREA Harold, *Col. Heft.*, XII, 1874, p. 57.

Caraça (Minas-Geraes).

CHR. EPHIPPİUM E. Lef.. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1884, *C. rend.*, p. CXCIV.
Tijuca (Rio).

LAMPROSPHERUS AMOENUS E. Lef., *Eumolp. Catalogus*, 1885, p. 9.

Terra-Nova (Bahia).

PHÆDRIAS OPACICOLLIS E. Lef.. *Rev. et Mag. de Zool.*, 1875, p. 106
(sub *Phædra*).

Salobro (prov. de Bahia).

Ann. Soc. ent. Fr. — Décembre 1888.

Iphiméltes.

IPHIMEIS DIVES Germ., *Ins. sp. nov.*, p. 565.

Caraça (Minas-Geraes).

I. FULVIPES Baly, *Ent. monthl. Mag.*, I, 1864, p. 134.

Caraça (Minas-Geraes).

NODONOTA ANGULICOLLIS E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1876, p. 283 (sub *Noda*).

Caraça (Minas-Geraes).

LEPRONOTA MORBILLOSA Chapuis, *Gen. Col.*, X, p. 242, note 1.

Caraça (Minas-Geraes).

Variat pedibus rufo-brunneis, tarsis nigro-cyaneis.

L. MARSHALLI Harold, *Col. Hest.*, XII, 1874, p. 63.

Caraça (Minas-Geraes).

L. SINGULARIS. — *Oblonga, parallela, subcylindrica, nigro-subænea vel æneo-virescens, antennis nigris, articulis 4 basalibus rufescens, pedibus nigro-piceis, tarsis obscure cyaneis.* — Long. 5—5 1/2 mill.; lat. 2 1/2—3 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput crebre punctatum, inter oculos spatio laevi tumido utrinque instructum, labro brunneo. Prothorax transversim convexus, dense confluenter et strigosim punctatus, lateribus utrinque fere rectis, antice tantum incurvis. Elytra grosse punctata, areis elevatis, lævibus, rotundis vel oblongis, versus apicem prope suturam subseriatim digestis.

L. TUBERCULATA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 122.

Caraça (Minas-Geraes); Tijuca (Rio).

L. VERRUCOSA. — *Lata ovata, valde convexa, saturate aut pallide fusca, magis minusve reflexo-ænea, parum nitida, antennis ferrugineis.* — Long. 5 1/2—6 mill.; lat. 2 3/4—3 mill.

Caput punctatum, inter oculos foveolatum, labro sicut et palpis ferrugineis. Prothorax dense strigosim punctatus. Elytra fortiter punctata, immixtis tuberculis rotundatis, magis minusve nigro-cyaneis, hic illic inordinatim digestis. Pedes robusti, femoribus subæneis, tibiis tarsisque fusco-brunneis.

♂. Primo tarsorum anticorum articulo valde dilatato.

Caraça. Matusinhos (Minas-Geraes).

L. OBSCURA Harold. *Col. Heft.*, XII, p. 59.

Tijuca (Rio); Terra-Nova (Bahia).

L. CYANELLA. — *Breviter ovata, valde convexa, luteo cyanea, subnitida, antennis nigris, articulis duobus primis ferrugineis.* — Long. 4 1/3—5 mill.; lat 2 1/2—3 mill.

Caput crebre sat fortiter punctatum, labro sicut et palpis nigro-piceis. Prothorax dense confluenter et strigosim punctatus. Elytra dense undique subrugose punctata, tuberculo leví apice summo tantum instructa. Pedes robusti, cyanei.

Caraça (Minas-Geraes).

L. PUBESCENS E. Lef.. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 422.

Caraça (Minas-Geraes).

TEASPES LUGUBRIS E. Lef.. *Eumolpid. Catalogus*, 1883, p. 20.

Caraça (Minas-Geraes).

AGBALUS LATERALIS E. Lef.. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1878, *C. rend.*, p. XLVII.

Caraça (Minas-Geraes).

La couleur de cette jolie espèce varie du vert métallique à reflets dorés ou enivrenx au bleu foncé, quelquefois presque violet.

A. TARSALIS E. Lef., *Eumolpid. Catalogus*, 1883, p. 22.

Matusinhos (Minas-Geraes).

COYTIERA MARGINICOLLIS E. Lef.. *Rev. et Mag. de Zool.*, 1875, p. 147.

Matusinhos (Minas-Geraes).

Colaspites.

METAXYONYCHA GRANULATA Gehrli.. *Mag. ent.*, IV, 1824, p. 480.

Tijuca (Rio).

M. COSTATA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 423.

Caraça (Minas-Geraes); Tijuca (Rio).

M. TETRASTICTA Marsh., *Ann. nat. Hist.*, 1864, p. 388.

Caraça (Minas-Geraes).

M. AURIPENNIS Germ., *Ins. sp. nov.*, p. 570.

Tijuca (Rio); Terra-Nova (Bahia).

Dans cette espèce, les mâles sont toujours moitié plus petits que les femelles.

M. MINARUM. — *Breviter oblonga, parallela, modice convexa, testacea, nitida, oculis, antennis (basi excepta), tibiis apice tarsisque nigris, elytris plagiis quatuor viridi-metallicis aut cyaneis.* — Long. 5—6 mill.; lat. 2 3/4—3 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput inter oculos obsolete impressum et remote punctatum. epistomate laevi, palparum articulo ultimo piceo. Prothorax transversus, in medio disci remote et inaequaliter, ad latera utrinque crebrius, sat fortiter punctatus, lateribus marginatus ibique medio bidenticulatus. Elytra juxta suturam sublineatim punctata, versus apicem fortiter punctato-striata, interstitiis elevatis, costaeformibus, disco exteriori fortius subconfluenter (δ), rugose granulatum (φ), punctata; singulo plagiis duabus magnis (altera basali, altera ultra medium, nec latera, nec suturam attingentibus) ornatis.

PRIONODERA PUSILLA. — *Suboblongo-ovata, parallela, superne modice convexa, corpore subtus cum capite, prothorace, scutello pedibusque late fulvo-testaceis, elytris metallico-viridibus, antennis (basi excepta) nigris.* — Long. 3—4 mill.; lat. 1 1/2—2 mill.

Matinsinhos (Minas-Geraes).

Caput remote punctulatum, inter oculos transversim impressum et spatio laevi calloso utrinque instructum, epistomate laevi. Prothorax transversus, sat dense undique punctatus, lateribus medio fortiter angulatus. Elytra infra humeros transversim evidenter impressa, juxta suturam sublineatim, disco exteriori autem fortius et confluenter subrugose punctata, versus apicem punctato-striata, interstitiis elevatis, laevibus.

COLASPIS FLAVIPES Oliv., *Ent.*, VI, p. 881, tab. 1, fig. 6.

Caraça (Minas-Geraes).

C. ÆRUGINOSA Germ., *Ins. sp. nov.*, p. 570.

Caraça (Minas-Geraes) : Tijuca (Rio).

C. VIRIDIPES E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 140.

Caraça (Minas-Geraes).

C. OCCIDENTALIS Linn., *Syst. Nat.*, ed. X. 1758, p. 369.

Caraça (Minas-Geraes).

C. INTRICATA. — *Breviter oblonga, subparallelia, convexa, viridi-metallica aut viridi-cyanea, nitidula, labro, palpis, antennis pedibusque luteo fulvis.* — Long. 5 1/2—6 mill.; lat. 2 3/4—3 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput punctulatum, inter oculos obsolete foveolatum, epistomate punctis nonnullis hic illuc instructo. Prothorax transversus, in medio disci subremote, ad latera utrinque crebrius et subconfluenter, punctatus, lateribus marginatus et medio fortiter angulatus. Elytra grosse undique confluenter punctata, intersticiis subelevatis rugas transversas formantibus, juxta suturam autem et versus apicem fortiter punctato-striata.

C. AEREA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, *Bull.*, p. cxxi.

Matusinhos (Minas-Geraes).

C. PRUINOSA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1878, *C. rend.*, p. XLVIII.

Caraça (Minas-Geraes).

C. 14-COSTATA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 144.

Caraça (Minas-Geraes).

C. TRIVIALIS Bohem., *Res. Engen.*, p. 169.

Caraça (Minas-Geraes).

C. INTERSTITIALIS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 144.

Tijuca (Rio).

C. NIGRIMANA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 147.

Caraça (Minas-Geraes); Tijuca (Rio).

C. AUROPUNCTATA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1884, *C. rend.*, p. CXCVI.

Tijuca (Rio).

C. VIOLACEA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 142.

Caraça (Minas-Geraes).

C. CUPRIPENNIS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 143.

Caraça (Minas-Geraes).

C. ANCEPS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1878, *C. rend.*, p. XLIX.

Tijuca (Rio).

C. COSTIPENNIS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 142.

Caraça (Minas-Geraes).

C. INCONSTANS E. Lef., *Mitth. Münch. Ent. Ver.*, 1878, p. 122.

Caraça (Minas-Geraes).

C. STRIGOSA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1878, *C. rend.*, p. XLIX.

Tijuca (Rio).

C. INTERRUPTA Haroild, *Col. Heft.*, XII, p. 64.

Tijuca (Rio); Terra-Nova (Bahia); Salobro (Bahia).

C. CRIBELLATA. — *Breviter orata, nigro-picea, supra obscure xenea, parum nitida, hic illic viridi-aureo-micans, anteunis (basi excepta) nigra, pedibus nigro-piceis.* — Long. 3 3/4—4 mill.; lat. 2—2 1/3 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput grosse subconfluenter punctatum, labro sicut et palpis nigro-piceis. Prothorax paulo latior quam longior, grosse confluenter rugose punctatus, lateribus medio bidenticulatus. Elytra foveolatim confluenter undique punctata, juxta suturam et versus apicem indistincte costulata, intersticiis disco exteriori elevatis, rugas transversas irregulares formantibus.

C. BRUNNIPES. — *Breviter ovata, convexa, corpore subitus cum pedibus magis minusre saturate brunnneo, supra xenea, nitidula, labro antennisque fulvo-testaceis, harum articulis 5 ultimis interdum nigro-infuscatis.* — Long. 3—3 1/2 mill.; lat. 2—2 1/2 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput remote punctulatum. Prothorax convexus, transversus, dense fortiter subrugoso punctatus, lateribus medio bisinuatus. Elytra grosse sed parum dense punctata, juxta suturam et versus apicem punctato-striata, punctis in impressionem basalem majoribus, intersticiis disco exteriori transversim subrugosis.

HERMESIA PURPUREA E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, *Bull.*, p. CLXXIX.

Caraça (Minas-Geraes).

H. JANTHINA E. Lef., *Eumolp. Catalogus*, 1885, p. 39.

Caraça (Minas-Geraes).

H. FULGIDICOLLIS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, *Bull.*, p. CLXXIX.
Caraça (Minas-Geraes).

CAMPYLOCHIRA FULVIPES E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1876, p. 294.
Tijuca (Rio).

C. PECTORALIS E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1876, p. 294.
Caraça (Minas-Geraes).

C. GOUNELLEI. — *Oblongo-elongata*, modice convexa, subtus magis minusve nigro-picea supra fulvo-testacea, nitidula, labro, palpis, antennis pedibusque concoloribus. — Long. 7—8 mill.; lat. 3 1/2—4 mill.
Caraça (Minas-Geraes).

Caput disperse punctulatum, inter oculos vase transversim impressum. Prothorax fere quadratus, in medio disci remote et tenuissime, ad latera utrinque crebrius et fortiter, punctatus. Scutellum lève. Elytra grosse nigro-punctata, versus apicem punctato-striata, interstitiis disco exteriori subelevatis, rugas irregulares formantibus.

PODOXENUS CHAPUISI E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877 p. 449.
Caraça (Minas-Geraes).

P. RUFICOLLIS. — *Oblongo-elongatus*, subparallelus, parum convexus, corpore subtus cum capite, prothorace pedibusque rufo-brunneus, labro, palpis antennarumque articulis quinque basalibus fulvis, harum articulis sex ultimis nigris, elytris saturate cyaneo-violaceis, apice summo magis minusve rufo-brunneis, tarsis nigro-infuscatis. — Long. 7 1/2—8 mill.; lat. 3 1/4—3 1/2 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput inter oculos obsolete depresso, sat fortiter undique punctatum, mandibulis oculisque nigris. Prothorax subquadratus, paulo latior quam longior, transversim convexus, in medio disci subremote, ad latera utrinque crebrius aciculatim subgrosse punctatus, interstitiis minutissime (oculo armato) punctulatis, lateraliter anguste marginatus et cyanens, ibique medio fortiter angulatus. Scutellum lève. Elytra elongata, prothorace basi latiora, infra basin utrinque subarcuatim evidenter impressa, humeris prominulis, lèvibus; superne modice convessa, disco exteriori crebre fortiter et inordinatim punctata, juxta suturam et versus apicem punctato-striata, interstitiis subelevatis, lèvibus. Femora postica mutica.

P. CÆRULEATUS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 450.

Tijuca (Rio).

Variat corpore cæruleo- vel æneo-viridi, vel cyaneo-nigro, interdum saturate cyaneo, pedibus rufo-brunneis.

P. LIMBATUS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 449.

Terra-Nova (Bahia); Caraça (Minas-Geraes).

Variat pedibus saturate rufo-brunneis aut piecis.

P. CICATRICOSUS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 451.

Caraça (Minas-Geraes).

Variat corpore superne metallico-æneo, nitido.

ENTOMOCHIRUS COSTULATUS. — ♂. *Invisus*. — ♀. *Oratus*, convexus, *subtus nigro-piceus*, *pube albida obtectus*, *supra obscure viridi-æneus*, *nitidulus*, *antennis (basi excepta) nigris*, *pedibus omnino rufescens*.
— Long. 5 mill.; lat. 2 1/2 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput sat dense punctatum, inter oculos impressum, labro palpisque fulvis, harum articulo ultimo nigro-infuscato. Prothorax transversim convexus, ad latera utrinque valde deflexus, crebre confluenter subrugoso punctatus, lateribus ante medium fortiter unidentatus. Scutellum laeve. Elytra crebre undique fortiter et confluenter punctata, interstitiis rugas transversas irregulares formantibus, costulis nonnullis longitudinalibus elevatis, praesertim versus apicem et ad latera, immixtis.

Chaleophanites.

HALCOPHANA VIRIDIPENNIS Germ., *Ins. sp. nov.*, p. 568.

Caraça (Minas-Geraes).

CH. LIMBALIS Harold, *Col. Hest.*, XII, 1874, p. 72.

Tijuca (Rio).

CH. HILARIS Germ., *Ins. sp. nov.*, p. 573.

Salobro (prov. de Bahia).

CORYSTHEA NIGRITARSIS. — *Oblonga*, modice convexa, fulvo-testacea.

nitidula, antennis (basi excepta) tarsisque nigris. — Long. 5 1/2—6 mill.; lat. 2 3/4—3 mill.

Caraça (Minas-Geraes).

Caput minutissime remote punctulatum, inter oculos obsolete impressum. Prothorax transversus, punctis nonnullis hic illuc, praesertim ad latera, instructus, lateribus utrinque marginatus et rotundatus. Elytra sublineatim punctata, punctis disco interiori et versus apicem minoribus.

STERNEURUS RUFIPES E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1875, p. 121.

Caraça (Minas-Geraes).

ST. LATERALIS E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1875, p. 122.

Terra-Nova (Bahia).

Leprotites.

BREVICOLASPIS VILLOSA J. Thoms., *Arch. entom.*, I, 1857, p. 292 (sub *Embryon*).

Caraça (Minas-Geraes); Tijuca (Rio).

Pseudocolaspites.

SPILEROPIS AERUGINOSA E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1876, p. 303.

Tijuca (Rio).

Eumolpites.

EUMOLPUS IGNITUS Fabr., *Mant. Ins.*, I, 1787, p. 68.

Caraça (Minas-Geraes); Matusinhos (Minas-Geraes); Tijuca (Rio); Terra-Nova (Bahia).

Edusites.

ARGOA CUPREATA. — *Oblongo-orata, convexa, subitus brunneo-testacea, aeneo-reflexo-lineta et pube albida obtecta, supra metallico-aenea, nitida, interdum cyanea, violacea aut subcuprea, labro, palpis, antennis pedibusque ferrugineis, his magis minusve aeneo-reflexo-linetis. — Long. 5—5 1/2 mill.; lat. 2 3/4—3 mill.*

♂. *Tibias duobus anticis apice abrupte ampliatis.*

Caraça (Minas-Geraes).

Caput creberrime confluenter rugose punctatum. Prothorax valde

convexus, in medio disci subremote, ad latera utrinque crebrius et substrigatim, punctatus. Scutellum laeve. Elytra fortiter punctata, versus apicem juxta suturam sat profunde punctato-striata, disco exteriori autem transversim subconfluenter strigata, intersticiis subelevatis, (oculo armato) minutissime alutaceis.

A. RUGULOSA. — *Suboblongo-ovata, concreta, aenea, subtus pube albida sat dense obtecta, labro, palpis antennisque ferrugineis. pedibus obscure fuso-brunneis, aeneo-reflexo-tinctis.* — Long. 6 mill.; lat. 4 mill.

Matusinhos (Minas-Geraes).

Caput creberrime confluenter rugose punctatum, in media fronte longitudinaliter parum profunde sulcatum. Prothorax creberrime substrigatim rugoso-punctatus, in medio disci spatiis nonnullis subcallosis instructus. Elytra densissime undique fortiter granulata, intersticiis infra humeros subelevatis, strigas transversas irregulares formantibus.

Myochreites.

CELLOMIUS (nov. gen.). — *Corpus suboblongo-ovatum, modice convexum, pilis adpressis squamiformibus obtectum. Caput thorace immersum, oculis parvis, rotundatis, integris, epistomate antice subrecte truncato. Antennae graciles, filiformes, paulo ultra prothoracis basin attingentes, articulis 5 ultimis leviter incrassatis. Prothorax convexus, paulo longior quam latior, margine laterali utrinque omnino spoliatus; ejusdem episternum margine antico radde convexo. Scutellum parvum, rotundatum. Prosternum breve, planum, latissimum, basi recte truncatum. Pedes sat validi, femoribus fusiformibus, subtus medio ampliatis ibique dente parvo armatis, tibiis simplicibus, quatuor anticis evidenter curvatis, unguiculis appendiculatis.*

Genre remarquable en ce qu'il tient à la fois des *Aadoxites* et des *Myochroites*. Mais l'ensemble de ses caractères le place dans les *Myochroites*, dont il diffère essentiellement par le prothorax dépourvu de bords latéraux. Les crochets des tarses appendiculés l'éloignent des *Aadoxites*.

C. MYOCHROITES. — *Suboblongo-ovatus, convexus, fusco-niger, pilis squamiformibus fulvo-albidis obtectus, labro, palpis, antennis, tibiis apice tarsiisque ferrugineis; prothorace creberrime confluenter punctato; elytris grosse punctatis, lineis elevatis nonnullis longitudinaliter instructis, pilis squamiformibus hic illuc fasciatim digestis.* — Long. 3 1/2—3 3/4 mill.; lat. 2—2 1/3 mill.

Caraca (Minas-Geraes).

Typophorites.

TYPOPHORUS FASCIATUS Germ., *Ius. sp. nov.*, p. 563.

Caraça (Minas-Geraes), avec toutes les variétés que j'ai signalées dès 1877 (*Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 316).

T. KIRBYI Baly, *Ann. nat. Hist.*, 1859, p. 128.

Les nombreux exemplaires rapportés par M. Gounelle, et dont plusieurs étaient accouplés, m'ont permis de reconnaître que les *T. Kirbyi* Baly, *T. basalis* Baly, *T. ruficollis* Baly et *T. sanguinicollis* E. Lef., ne constituent qu'une seule et même espèce, à laquelle je crois devoir conserver le nom de *Kirbyi*, en lui assignant la diagnose suivante :

Oblongus, niger, obscure cyaneo- vel zeno-reflexo-tinctus, nitidus, elytris singulo fascia lata basali rufa instrutis, pedibus cyaneo-nigris aut rufis.

♂. *Primo tarsorum anticorum articulo dilatato; elytrorum punctis fere usque apicem extensis.*

♀. *Primo tarsorum anticorum articulo triangulari; elytrorum punctis versus apicem fere omnino deletis.*

(*T. basalis* Baly, *Ann. nat. Hist.*, 1859, p. 128.)

Var. β. — *Capite, thorace, scutello elytrorumque parte tertia antica rufis.*

(*T. ruficollis* Baly, *Ann. nat. Hist.*, 1859, p. 128.)

Var. γ. — *Capite thoraceque rufis, elytris nigris, pedibus concoloribus vel rufis.*

(*T. sanguinicollis* E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1876, p. 306.)

Var. δ. — *Omnino niger, pedibus concoloribus aut rufo-brunneis.*

Caraça (Minas-Geraes).

T. HUMERALIS Baly, *Ann. nat. Hist.*, 1859, p. 128,

Var. *rufus* Jacoby, *Proc. zool. Soc.*, 1876, p. 815.

Caraça (Minas-Geraes).

T. VERSUTUS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 317.

Tijuca (Rio); Terra-Nova (Bahia); Matusinhos (Minas-Geraes).

T. MACULIPENNIS E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1876, p. 307.

Terra-Nova (Bahia); Matusinhos (Minas-Geraes).

T. GENICULATUS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1878, *C. rend.*, p. L.
Caraça (Minas-Geraes).

T. UMBRATUS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, p. 318.
Caraça (Minas-Geraes).

T. JACOBYI E. Lef., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, *Bull.*, p. LXXVI.
Matusinhos (Minas-Geraes).

T. SIMPLEX E. Lef., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1884, *C. rend.*, p. CLVI.
Caraça (Minas-Geraes).

T. BIPLAGIATUS Bohem., *Res. Eugen.*, p. 163.
Tijuca (Rio).

T. PYGMÆUS E. Lef., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1884, *C. rend.*, p. CCIV.
Caraça (Minas-Geraes).

T. CENTROMACULATUS. — *Late et breviter ovatus, convexus, subtus cum capite, prothorace pedibusque fulvo-rufis, antennis (basi excepta) piceis, elytris nigris, nitidis, macula communi media triangulari fulvo-rufa ornatis, femoribus muticis.* — Long. 2—2 1/3 mill.; lat. 1 1/2 mill.

Salobro (Bahia).

Caput laeve, inter oculos transversim fortiter sulcatum. Prothorax levis, in medio disci punctis nonnullis hic illuc vix visibiliter (oculo armato) instructus. Elytra levia, infra humeros obsolete transversim impressa ibique lineatim sat fortiter, sed brevissime, punctata, juxta suturam versus apicem leviter unistriata.

T. ERYTHIROPUS. — *Ovatus, convexus, niger, nitidus, antennis flavis, articulis 5 ultimis nigro-infuscatis, pedibus rufo-fulvis, femoribus muticis.* — Long. 1 3/4—2 mill.; lat. 1—1 1/3 mill.

Var. β. — *Capite prothoraceque fulvo-rufis.*

Tijuca (Rio).

Caput laeve, inter oculos profunde sulcatum. Prothorax in medio disci punctis nonnullis disperse notatus. Elytra infra humeros obsolete transversim impressa, lineatim punctata, punctis intra impressionem basalem majoribus, versum apicem omnino deletis.

T. TARSALIS. — *Late ovatus, convexus, niger, nitidus, antennis flavis, articulis 5 ultimis nigro-piceis, pedibus nigris, femoribus muticis, tarsis fulvis.* — Long. 3 1/2—4 mill.; lat. 1 3/4—2 mill.

Var. β . — *Capite prothorace que rufo-brunneis.*

Tijuca (Rio).

Caput laxe, inter oculos sulco profundo instructum. Prothorax disperse punctatus. Elytra lœvia, infra humeros transversim evidenter impressa ibique lineis punctorum brevibus instructa.

PARIA GOUNELLEI. — *Suboblongo-ovatus, convexus, rufo-fulvis, nudidus, clytris singulo vitta basali intra callum humerale et scutellum longitudinali, cum alterna obliqua latiori ultra medium posita (marginem lateralem suturamque attingente) coeunte, nigris aut fuscis. — Long. 3 1/2—4 mill.; lat. 1 3/4—2 mill.*

Tijuca (Rio).

Caput laxe, inter oculos leviter sulcatum, antennis rufo-fulvis. Prothorax lœvissimus. Elytra infra humeros sat fortiter transversim impressa, lineatim punctata (punctis intra impressionem basalem majoribus, ultra medium autem evanescentibus). Pedes rufo-fulvi, femoribus subtus dente minuto armatis.

P. STIGMULA. — *Oblonga, convexa, parallela, rufo-fulva aut flava, nitidula, prothorace linea longitudinali media nigra notato, clytris singulo limbo suturali maculisque duabus minutis nigris aut fuscis (altera basali, inter callum humerale et scutellum, altera ultra medium, extorsum arcuata, sexpius bipartita) notatis. — Long. 3 1/2—4 mill.; lat. 1 1/2—1 3/4 mill.*

Var. β . — *Thorace elytrisque immaculatis.*

Tijuca (Rio).

Caput laxe, antennis flavis. Prothorax lœvissimus. Elytra infra humeros obsolete transversim impressa, lineatim punctulata, punctis intra impressionem basalem paulo majoribus, ultra medium autem omnino deletis. Pedes rufo-fulvi aut flavi, femoribus subtus dente minuto acuto armatis.

P. MACULIGERA. — *Lata et breviter ovata, convexa, subitus nigro-picea, supra cum antennis pedibusque late fulva, nitidula, prothorace elytrisque nigro-piceo variegatis. — Long. 2—2 1/2 mill.; lat. 1—1/3 mill.*

Var. β . — *Minor, prothorace nigro-piceo, vase æneo-reflexo-tincto.*

Var. γ . — *Piceo-niger, antennis flavis, apice nigricantibus, pedibus brunneo-testaceis.*

Tijuca (Rio).

Caput inter oculos profunde sulcatum, vertice fere laxe, epistomate

crebre fortiter punctato. Prothorax in medio disci remote, ad latera crebrius et fortius, punctatus, macula magna laterali nigro-picea, vase aeneo-reflexo-tincta, utrinque notatus. Scutellum piceo-nigrum. Elytra infra humeros sat fortiter transversim impressa, grosse lineatim substriato-punctata (punctis intra impressionem basalem majoribus), limbo laterali utrinque, sutura et in singulo maculis tribus (una basali inter callum humerale et scutellum, altera media suborbiculari, altera subapicali obliqua, praecedenti saepius connexa) nigro-piceis, vase aeneo-reflexo-tinctis.

Endocéphalites.

COLASPOIDES VULGATA E. Lef., *Eumolp. Catalogus*, p. 160.

Tijuca (Rio); Terra-Nova (Bahia).

C. TIBIALIS E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1873, p. 136.

(*Pleuraulaca blanda* Dej., *Cat.*, éd. 3, p. 433.)

Matusinhos (Minas-Geraes).

C. FULGIDA E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1873, p. 138.

Caraça, Matusinhos (Minas-Geraes).

C. RUFITARSIS E. Lef., *Rev. et Mag. de Zool.*, 1873, p. 137.

Caraça (Minas-Geraes).

C. TRIGONOMERA. — *Breviter ovata, valde convexa, subtus cum pedibus cyanea, supra riridi-metallica, magis minusve aureo-cupreo-micans, nitidissima, antennis, tibiis apice tarsisque late fulvis.* — Long. 4 3/4—6 mill.; lat. 2 3/4—3 3/4 mill.

Caput remote minute punctulatum, in media fronte magis minusve profunde foveolatum, labro piceo, palpis fulvis. Prothorax transversus, laevis, punctis nonnullis hic illuc vix visibiliter (oculo armato) instrutus. Elytra minute disperse punctulata, juxta suturam versus apicem unistriata. Pedes robusti, breves, femoribus duobus anticus valde ampliatis, compressis, subtus angulatis et medio dente valido armatis, tibiis apice ampliatis, duobus anticis apice abrupte curvatis.

C. MERA Germ., *Ins. sp. nov.*, p. 562.

Caraça. Matusinhos (Minas-Geraes).